



RECOMENDACIONES AL ALTA A PACIENTES SOMETIDAS A DRENAJE DE BARTHOLINITIS

¿QUE ES LA BARTHOLINITIS?

Se trata de una infección de la glándula de Bartholino, que está situada a ambos lados de la vagina en su porción más inferior, cerca del himen. La infección, en muchas ocasiones, provoca una obstrucción del conducto de la glándula, dando lugar a un absceso o acumulación de pus.

EDUCACION SANITARIA SOBRE CUIDADOS AL ALTA

Al alta hospitalaria usted debería seguir las siguientes recomendaciones:

CUIDADOS DE LA CICATRIZ QUIRURGICA

Debe estar siempre seca, de modo que después de la ducha diaria debe secarse, pudiendo utilizar para ello un secador de pelo.

COMPLICACIONES POST-QUIRÚRGICAS

Al ser dada de alta, el médico se ha cerciorado que esté en las condiciones idóneas para seguir se recuperación en domicilio. A pesar de ello puede surgir alguna complicación después del alta:

- Problemas de cicatrización de la herida.
- Supuración de la herida.
- Aumento de temperatura. Superior a 38 ° C

No dude en consultar con su médico de cabecera o acudir a urgencias de nuestro hospital.

RELACIONES SEXUALES

Puede mantener relaciones sexuales desde que lo desee; pero no el coito hasta 7 días de la intervención.