


RECOMENDACIONES

para pacientes en tratamiento
con **MITOMICINA y BCG**
mediante instilación vesical



Área de consultas externas.
Urología



Empresa Pública Hospital Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD

Realizado: Mabel Elorza Maza
Enfermera consulta de urología

Carretera Nacional 340, Km 187
29600 Marbella (Málaga)
www.hcs.es



Agencia Sanitaria Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL


¿En qué consiste la instilación vesical?

Consiste en la introducción mediante una sonda de pequeño calibre, de un fármaco en su vejiga. Esta sonda se retirará tras administrarle el medicamento

¿Para qué se administran o instilan estos fármacos en la vejiga?

Mitomicina: (quimoterápico intravesical) se administra tras una RTU (Resección Transuretral), para prevenir recurrencia o evitar la progresión de su enfermedad.

BCG : (inmunoterapia intravesical) se emplea como tratamiento de tumores vesicales superficiales de alto grado y de carcinoma in situ de vejiga para intentar reducir las recidivas y la progresión de la enfermedad



Tratamiento con MITOMICINA

La pauta normal de administración, son 4 dosis administradas semanalmente y otras cuatro de forma mensual, en total **8 dosis**.

- Una vez puesta la medicación se debe mantener **1.5-2 horas** en la vejiga.

Durante las 6 horas siguientes a la instilación, se debe neutralizar la orina con **lejía** a partes iguales para su eliminación. Durante este tiempo el paciente debe orinar sentado y en casa en el WC, para evitar salpicar.



- Los **efectos secundarios** que pueden aparecer son: molestias al orinar, orinar de forma frecuente, sangrado con la orina.

Se recomienda **beber abundante agua** una vez eliminado el tratamiento.

- Al paciente se le facilitará tratamiento **antibiótico de forma preventiva** por la manipulación uretral, deberá tomar un comprimido de norfloxacino cada 12 horas durante dos días.

- En caso que no pudiese acudir a la próxima cita, debe ponerse en contacto con la consulta en el **951976820**

Tratamiento con BCG

La pauta normal de administración, son **6 dosis** administradas en 6 semanas consecutivas.

- Una vez puesta la medicación se debe mantener **1.5-2 horas** en la vejiga.

- Durante las 6 horas siguientes a la instilación, se debe neutralizar la orina con **lejía** a partes iguales para su eliminación. Durante este tiempo el paciente debe orinar sentado y en casa en el WC, para evitar salpicar.

- Durante todo el periodo que dure el tratamiento se recomienda utilizar **preservativo**.

- Los **efectos secundarios** que pueden aparecer son: molestias al orinar, orinar de forma frecuente, sangrado con la orina y aumento de la temperatura corporal (**fiebre**)

- Si el aumento de la temperatura persiste durante más de 24 horas, manteniendo cifras de **38°C**, se debe poner en contacto con el servicio de urología.



- Se recomienda **beber abundante agua** una vez eliminado el tratamiento.

- En caso que no pudiese acudir a la próxima cita, debe ponerse en contacto con la consulta en el **951976820**