



Agencia Sanitaria Costa del Sol
CONSEJERÍA DE SALUD

UNIDAD DE UROLOGÍA

HOSPITAL COSTA DEL SOL
MARBELLA

INFORMACIÓN AL PACIENTE : USO DE MEDICAMENTOS.

PROCESO: HIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

ALFABLOQUEANTES

Su médico le ha prescrito una medicación para tratar sus síntomas miccionales debidos a su hipertrofia prostática (alfabloqueantes).

El objetivo de la medicación es que pueda usted orinar con menos dificultad, con un chorro más potente, y con menos frecuencia, mejorando así su calidad de vida.

La medicación se administra en una sola dosis diaria, preferentemente antes de acostarse.

Su uso debe ser continuado hasta nueva orden médica. Debe evitar olvidarse de tomar su dosis diaria.

Los efectos secundarios de la medicación son poco frecuentes, pero es necesario advertir que a veces puede provocar sensación de vértigo o mareo ya que puede disminuir la tensión arterial. Por dicho motivo y para evitar algún tipo de accidente aconsejamos que la tomen antes de acostarse. Si se produjera este tipo de alteraciones debe suspender la medicación y consultar con su médico de cabecera o especialista que decidirán si debe de continuar o cambiar a otro tipo de medicación. Otro efecto secundario aunque poco frecuente es la eyacuación retrograda, es decir parte del semen emitido se depositará en vejiga por lo que puede notar una disminución del volumen de eyaculado. Este efecto no tiene importancia y es reversible si se suspende la medicación.

Si por cualquier circunstancia usted va a ser intervenido de cataratas, debe comunicar a su oftalmólogo que está tomando este tipo de medicación para la próstata ya que existe la posibilidad de que haya que suspenderla temporalmente.